



Buran

Fongicide

Buran est un fongicide pour l'utilisation dans les vergers et les vignobles. À inclure dans votre programme de lutte intégrée pour lutter contre la tavelure et le blanc.

Prévention des maladies dans les vergers et les vignobles

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

- ✓ **Aucun délais** avant récolte, permettant ainsi de conserver le contrôle de la maladie et la qualité de la récolte
- ✓ **Sécuritaire** pour les organismes bénéfiques et les pollinisateurs lorsque le produit est utilisé conformément au mode d'emploi de l'étiquette
- ✓ **Peu de risque** de développement de résistance
- ✓ **S'intègre parfaitement** à votre programme de lutte intégrée
- ✓ **Excellente alternative** à utiliser en rotation avec d'autres produits ou pour les mélanges en réservoir

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **Ingrédient actif:** Ail
- **Emballage:** Une (1) caisse = 2 x 10L
- **Formulation:** Liquide concentré
- **Groupe chimique:** S/O Biopesticide
- **Délai avant la récolte:** 0 jour
- **Délai de réentrée:** Lorsque le produit est sec

RECOMMANDATIONS POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

- Utiliser le volume d'eau minimal pour obtenir une bonne couverture des feuilles, fleurs et fruits
- Appliquer tous les 7 à 10 jours lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie
- Utiliser en complément des fongicides protectants
- Toujours lire et suivre les instructions sur l'étiquette

MODE D'UTILISATION

CULTURE	MALADIE	TAUX D'APPLICATION	VOLUME DE PULVÉRISATION	INTERVALLE D'APPLICATION
Pommier, Poirier, Pommetier	Oïdium (blanc) (<i>Podospaera leucotricha</i>)	9 L/ha	Utiliser le volume de pulvérisation minimal pour obtenir une couverture complète du feuillage (500 - 800 L/ha)	Appliquer lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie
	Tavelure du pommier (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pirina</i>)			Appliquer après la pluie ou après une période d'humidité prolongée, lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie (post infection; après éjection jusqu'à 350 DH).
Vigne	Oïdium (blanc) (<i>Erysiphe necator</i>)	18 L/ha	Utiliser le volume de pulvérisation minimal pour obtenir une couverture complète du feuillage (500 - 800 L/ha)	Appliquer lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie
Sous-groupe 9B (incluant courge et concombre)	Oïdium (blanc) (<i>Sphaerotheca fuliginea</i> syn. <i>Podospaera xanthii</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i>)	18 L/ha	Utiliser le volume de pulvérisation minimal pour obtenir une couverture complète du feuillage (700 L/ha)	Appliquer lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie



L'usage avec de l'Agral ou Ag-Surf en mélange avec un fongicide à base de mancozèbe n'est pas recommandé.

Buran est homologué au Canada pour AEF Global. Se référer à l'étiquette du produit pour les détails complets concernant l'application. Toujours lire et suivre les informations fournies sur l'étiquette. Aller au www.aefglobal.com pour une information complète sur le produit.